

Número de inscrição dos candidatos requisitantes:

002.327-2; 002.327-2; 003.920-9; 004.132-7; 005.895-5; 007.386-5; 007.987-1; 008.674-6; 010.857-1; 011.041-8; 011.163-5; 011.163-5; 012.541-5; 013.087-7; 013.087-7; 014.749-4 e 014.895-4.

Questão 18)

Uma diurese de menos de 30mL/hora indica possível alteração circulatória, no volume sanguíneo ou renal. Fonte: POTTER, Patrícia. Fundamentos de enfermagem. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. (p.1066-1067).

Questão 24)

Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados como casos de emergência médica, uma vez que, para se obter maior eficácia, as intervenções para profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B necessitam ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente. Trata-se, portanto de uma emergência. Fonte: RECOMENDAÇÕES PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A MATERIAL BIOLÓGICO: HIV E HEPATITES B e C. Disponível em: < http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/04manual_acidentes.pdf> Acesso em 27/12/2018.

Questão 26)

“Na prática diária, no nascimento do RN prematuro de muito baixo peso, além do controle da temperatura ambiente, as medidas para fornecer calor ou diminuir a sua perda têm sido usadas de forma associada, como por exemplo, o uso de saco plástico e de gorro ou, se o RN estiver mais estável, gorro e contato pele a pele.”
<http://www.redeblh.fiocruz.br/>

O contato pele a pele destina-se a recém nascido mais estável, conforme referido no texto acima e citada pelo(a) candidato. Uma vez que a questão (número 26) aponta apenas para o peso e idade gestacional, adotamos como resposta certa o uso de saco plástico transparente de polietileno, resposta C, como recomendado na referência abaixo.

“Em RN com idade gestacional inferior a 29 semanas ou peso ao nascer inferior a 1.500g, recomenda-se o uso de saco plástico transparente de polietileno .”
http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v1